

Complexe liquide de Zinc sous forme organique à fort pouvoir de pénétration et translocation
Correcteur de carence en Zinc sur toutes cultures

Propriétés

SyniZinc 50 est un complexe de Zinc sous forme organique à fort pouvoir de pénétration et translocation. Son apport est indispensable pour l'obtention de récolte de qualité:

- . Rôle déterminant pour la nouaison et le calibre
(facteur anti-coulure physiologique)
- . Activateur du métabolisme de la plante
(agit sur le développement racinaire, la photosynthèse, participe à la synthèse d'acide gibberrélique, ...)
- . Maturité uniforme des récoltes

DOSES ET MODE D'EMPLOI

Cultures	Doses et Mode d'emploi
Pommes de Terre	5 litres/hectare - 1 semaine après la levée
Melon	5 litres/hectare - 2 applications depuis stade 4 feuilles jusqu'à nouaison
Pastèque	5 litres/hectare - Jusqu'à première floraison
Oignons	6 litres/hectare - Depuis le stade 2ème/3ème feuille jusqu'à la chute des premières feuilles, apparition de la 7ème feuille.
Haricots verts	250 - 300 cc/100 litres d'eau en mélange avec SYNISLOW à la dose de 300 cc/100 litres d'eau depuis stade 4 - 8 feuilles jusqu'à début floraison. 3 à 4 applications avec un intervalle de 7 jours entre les traitements.
Tomates	5 litres/hectare - Stade: 4 - 6 feuilles
Vigne	2 applications : Avant et Après Floraison à la dose de 3 litres/hectare/application. Au total de 6 litres/hectare

COMPOSITION P/P :

- Zinc (Zn): 7% complexé par des acides polyhydrocarboxyliques
- Azote (N): 15%
 - . Nitrique: 1,2%
 - . Amoniacal: 5,0%
 - . Organique : 3,3%
 - . Uréique : 5,5%

pH = 4.0 – 4.5

Densité = 1270 g/l

syniZinc 50

Cultures	Doses et Mode d'emploi
Céréales	4 litres/hectare - Stade: formation du second nœud
Maiz	4 litres/hectare - Stade: 5 - 6 feuilles jusqu'au stade 10 feuilles
Canne à sucre	8 litres/hectare - Stade: 60 à 80 jours après redémarrage de la pousse
Riz	En fonction du pH des sols: de 10 à 20 litres - De 35 à 55 jours après semi. Ne pas appliquer avec Propanil.
Café	8 - 10 litres/hectare. Stade: première application avant floraison et la seconde optionnelle: 4 mois plus tard

Cultures	Doses et Mode d'emploi
Agrumes	Première Application: 6 litres/hectare - Stade: pousse de printemps à 50% développée. Concentration: 0,6 litre/100 litres d'eau - Seconde Application: 6 litres/hectare - Stade: pousse d'été ou d'automne. Concentration: 0,6 litre/100 litres d'eau
Poiriers, Pommiers, Abricotiers,...	Première Application: 6 litres/hectare - Stade: E, E2 : gonflement. Concentration: 0,6 litre/100 litres d'eau Seconde Application: 6
Banane	4 - 6 litres/hectare. Sortie de la hampe florale
Ananas	4 - 6 litres/hectare. Stade: juste avant la formation de la fleur
Papaye - Mangue	5 - 10 litres/hectare. Stade: juste avant la formation de la fleur

IMPORTANT:

Si une pluie survenait 3 heures après traitement, compte tenu du fort pouvoir de pénétration du SyniZinc 50, il serait inutile d'effectuer une nouvelle application.

SyniZinc 50 peut être utilisé en pleine floraison sans risque de brûlure à la dose de:
0,5 l/100 litres d'eau

Sous serre, ne pas dépasser la concentration maximum de 0,250 l/hl (toutes cultures) et éviter de traiter aux heures de fort ensoleillement